



# СКРИНІНГ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРО КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ

І. В. ЛУТАЙ, М. Д. ЧЕМИЧ, Т. А. ГУСЕВА, А. С. ІВАНОВА  
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ

Лайм – бореліоз є найпоширенішим трансмісивним захворюванням, що передається кліщами. Хвороба є значною медичною проблемою з огляду на можливість ураження багатьох органів і систем, схильністю до хронізації, тривалої втрати працездатності, інвалідизації. Найбільший відсоток хворих припадає на працездатне населення, та завдає значних збитків державі.

Спостерігається тенденція до зростання захворюваності на хворобу Лайма у Сумській області. Так, в Україні у 2015 р. інцидентність складала 7,96 на 100 тис. населення, а у 2019 р. - зросла до 10,62. Перевищення середнього рівня показників реєструється у Київській (29,0), Черкаській (25,4), Вінницькій (23,09), Сумській (25,89) областях та м. Київ (22,54).


Пік активності кліщів в Україні реєструється у травні. Збільшення кількості випадків захворювання вказує на масове поширення збудників хвороби Лайма у Сумській області. Для того, щоб попередити дану недугу, необхідно вивчити усі можливі причини та знайти шляхи їх вирішення. Це і стало підставою для створення уніфікованого анонімного опитувальника, який висвітлює основні питання стосовно даного захворювання з позиції різних категорій населення.

**Мета роботи.** Оцінити обізнаність населення щодо хвороби Лайма за результатами проведеного анкетування осіб, що зазнали нападу кліщів.

**Матеріали та методи.** Дослідження проводилося методом соціологічного опитування (очного, одноразового, індивідуального) зі збереженням умов конфіденційності, виконано у КНП СОР МКЦИХТД імені З. Й. Красовицького та Університетській клініці СумДУ.

Всього в опитуванні взяли участь 56 осіб, які проходили амбулаторне та стаціонарне лікування з приводу захворювання на Лайм-бореліоз.


**Висновки.** Найбільший відсоток хворих припадає на працездатне населення (42,86 %), що призводить до значних матеріальних збитків. Найчастіше місцем присмокування кліща є нижні кінцівки (46,43 %). Серед клінічних форм Лайм-бореліозу переважає еритемна (91,07 %), хоча спостерігається також ураження суглобів і нервової системи. Дані опитування осіб, які зазнали нападу кліщів, свідчать про низьку обізнаність населення щодо заходів профілактики та способів видалення членистоногих.



Регіон де відбулось присмокування кліща




Розподіл антропогенних осередків



Локалізація місця присмокування кліща



Наявність присмокування кліща



Клінічні ознаки хвороби Лайма