



# ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БЕШИХИ

О. С. Саєнко, М. Д. Чемич, В. О. Майборода, О. А. Ворожко

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, Сумський державний університет



**Мета роботи:** виявити епідеміологічні особливості перебігу первинної, повторної та рецидивної бешихи.

## Матеріали та методи


93 особи

Первинна бешиха (n-59)

Повторна бешиха (n-18)


Рецидивна бешиха (n-16)

## Розподіл за статтю (%)




Середній вік пацієнтів: 56,6 (± 15,5) року


## Локалізація патологічного процесу



## Клінічні форми (%)



## Провокуючі фактори (%)



**ВИСНОВКИ:** Частіше хворіють на бешиху жінки середнього віку (63,44 %). Здебільшого зустрічається, за часом виникнення, первинна бешиха (63,44 %), з переважанням еритематозної форми (82,79 %) з локалізацією ураження на нижніх кінцівках (81,72 %).

Провокуючими факторами первинної та рецидивної бешихи є травми, переохолодження, рани та перенесені захворювання дихальних шляхів (ГРВІ, ангіна, ХОЗЛ, бронхіт).