



МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ПРИ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С


А. О. Горбачевський, М. Д. Чемич

Сумський державний університет, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією




Мета. Встановити морфофункціональні зміни печінки при вірусному гепатиті С

Розподіл хворих за статтю




Розподіл хворих за ступенем активності




Вміст тромбоцитів ($\times 10^9/\text{л}$)

Контрольна група	Група дослідження
202,79 \pm 7,69	129,37 \pm 10,33

Розподіл хворих за генотипом віруса



Вираженість цирозу (Чайлд П'ю)



Встановлення змін при УЗД



Частота реєстрації ускладнень



Висновки: серед 107 досліджених пацієнтів переважають чоловіки середнього віку - (42,13 \pm 1,78) року; активність перебігу у більшості хворих мінімальна - (66,6 %). Домінуючий генотип - 1 (32,7 %). За класифікацією Чайлд П'ю клас А реєструється частіше ніж інші (23,07 %). При лабораторному дослідженні встановлено, що у всіх хворих спостерігається стійка тромбоцитопенія. Підвищення ехогенності при УЗД - у (78,9 %), ущільнення стінки жовчного міхура - у (31,6 %). З ускладнень найчастіше зустрічалась - портальна гіпертензія (50,9 %), гіперспленізм (37,2 %).