



Львівський національний  
медичний університет  
імені Данила Галицького



# Етіологічна структура сальмонельозу кінця ХХ – початку ХХІ століття у Львівській області

О.П.Адамович

## Актуальність

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) надалі залишаються актуальною проблемою інфектології. Все частіше серед населення виникають великі спалахи спричинені сальмонелами, обумовлені грубими порушеннями санітарних норм і правил.


## Мета

Встановити етіологічну структуру сальмонельозу на зламі ХХ — ХХІ сторіч у Львівській області.

## Матеріали та методи

Архівні дані 40 карт стаціонарних хворих (КСХ) за 2017 рік та аналогічну кількість за 1992 рік пацієнтів Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, аналіз наявних даних у вітчизняній літературі за темою дослідження.

## Частота випадків захворювання, спричинених різними збудниками



## Висновки

У ХХІ сторіччі у Львівській області спостерігається зміна етіологічної структури сальмонельозу. Найчастіше реєструються випадки спричинені *S. enteritidis*.

- Епідеміологічний аналіз засвідчив, що якщо всі випадки захворювання сальмонельозом у 1992 році були спорадичними, то у 2017 році поодинокі випадки фіксувались у шести хворих, всі решта були груповими.
- Клінічна симптоматика в усіх випадках була подібною: загальна слабкість, підвищена температура тіла, нудота, блювання, діарея.

