



Динаміка росту захворюваності на ко-інфекцію СНІД/Туберкульоз у різних областях України

Янчук Світлана Миколаївна, Чемич Микола Дмитрович
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
Сумський державний університет



Актуальність. Проблема ВІЛ-інфекції, особливо у поєднанні з туберкульозом має світове значення, що потребує найбільш швидкого вирішення у зв'язку з темпами росту та несприятливим прогнозом на майбутнє, так як впливає на репродуктивну функцію популяції населення країн всього світу, а також має тенденцію до зниження рівня і тривалості життя дорослого працездатного населення.

Мета. Порівняти показники захворюваності на ко-інфекцію СНІД/Туберкульоз серед громадян України, визначити передбачувані причини подальшого зростання.

Висновки. За даними ЮНЕЙДС в Україні туберкульоз є найпоширенішою причиною смерті серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Хоча спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності, однак проблема залишається актуальною, особливо у деяких регіонах України. Рівень захворюваності на туберкульоз у ВІЛ-інфікованих залишається високим, що пов'язано з низькою прихильністю до лікування та недостатнім рівнем довіри до лікарів.



341 084 особи захворіли на ВІЛ-інфекцію


• за період з 1987-2019 рік

114 487 осіб

• захворіли на СНІД

49 751 осіб

• померли від СНІД-асоційованих інфекцій



За 2019 рік у світі померло від ВІЛ-асоційованого туберкульозу 208 000 людей



За даними Центру медичної статистики за 2019 рік кількість хворих на активний туберкульоз усіх форм складає 4 398

Матеріали і методи. Використані статистичні дані «Центру медичної статистики» МОЗ України, «Центру громадського здоров'я» та дані ВООЗ

НАЙБІЛЬШ УРАЖЕНІ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ВІЛ-ТУБЕРКУЛЬОЗ (НА 100 000 НАСЕЛ.)

